


Information til vordende forældre

Forstørret nyrebækken hos fostret




Hvis der fortsat ses udvidet nyrebækken efter fødslen kane årsagen være tilbageløb (refluks)

Ved refluks løber urinen fra blæren op i urinlederen når barnet tisser og der kommer en ophobning af urin i nyrebækkenet. De fleste børn vokser sig fra tilstanden.



Refluks

En anden årsag til forstørret nyrebækken er en forsnævring i afløbet fra nyrebækkenet. Forsnævringen kan sidde ved overgangen mellem nyrebækken og urinleder eller hvor urinlederen løber ind i blæren.



Forsnævring på overgangen mellemnyrebækken og urinleder.

Betydningen af forstørret nyrebækken

I langt de fleste tilfælde er det uden betydning, at nyrebækkenet på den ene nyre er forstørret og tilstanden vil forsvinde af sig selv i løbet af graviditeten eller efter fødslen.

I sjældne tilfælde vil der være store mængder urin ophobet i nyrebækkenet.

Det kan give et øget tryk på nyrevævet og hæmme dets udvikling.

Så længe det kun er den ene nyre, der har forstørret nyrebækken har det ingen betydning for den samlede nyrefunktion.

Drejer det sig derimod om forstørrede nyrebækkener på begge sider, skal man være opmærksom på, om barnets samlede nyrefunktion er truet.

Kontroller i graviditeten

Selv om et forstørret nyrebækken ofte forsvinder af sig selv vil I blive tilbudt ekstra ultralydsscanninger for at følge tilstanden. Hyppigheden af scanningerne afhænger af hvor stort nyrebækkenet er og af om det kun er det ene eller begge nyrebækkener, der er forstørret.

Hvis der stadig ses forstørret nyrebækken omkring 32. uge vil I blive tilbudt en scanning af barnets nyrer 5-10 dage efter fødslen.

Er begge nyrebækkener forstørrede, vil man vurdere om barnets samlede nyrefunktion er truet og i ekstremt sjældne tilfælde kan der blive tale om at sætte fødslen i gang hvis man skønner, at nyrerne skal aflastes.

Efter fødslen

Hvis man ved scanningen efter fødslen stadig ser et forstørret nyrebækken vil I blive tilbudt kontrol hos børnelæge.

Når nyrebækkenet er forstørret er der let øget risiko for urinvejsinfektion.

Hvis også urinlederen er forstørret er risikoen så stor, at nogle læger anbefale at barnet får en lille dosis antibiotika hver aften.

Hvis nyrebækkenet efter fødslen er meget stort vil I få tilbudt en undersøgelse af nyrenes funktion 4-6 uger efter fødslen.

I sjældne tilfælde kan der blive tale om operation. Hvis det bliver tilfældet vil I blive grundigt informeret og alle behandlingsmuligheder vil blive drøftet med jer.

I langt de fleste tilfælde, også hvor nyrebækkenet er meget stort, er operation ikke nødvendig og I vil blot blive tilbudt kontrol af, at barnets nyrer udvikler sig normalt.